

# ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ခွဲစိတ်နည်း

## ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ကို တမင်တကာ အဆုံးသတ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်

ပထမ အဆင့်မှာ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအတွက် ရက်ချိန်းတစ်ခုကို လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဆွေးနွေးမှုအတွင်း ဆရာဝန်သည်-

- ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာ သင့်အတွက် သင့်တော်သည် ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုပေးပါမည်
- ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရေး၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းပြောပြပါမည်
- တီဗီခါတ်မှန် နှင့် သွေးစစ်ဆေးမှုကို လိုအပ်သလို စီစဉ်ပေးပါမည်
- အကယ်၍ သင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်မည်ဆိုလျှင် လက်မှတ်ထိုးပေးရန် သဘောတူညီချက်ပေးမည့် ပုံစံတစ်စောင်ကို ပေးပါမည်
- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ရန် အစီအမံများကို လုပ်ပါမည်

အချို့ဆေးခန်းများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးသည့်နေ့မှာပင် လုပ်ပေးသည်။ အခြားဆေးခန်းများတွင် အခြားနေ့တစ်နေ့တွင် လုပ်ပေးသည်။

## ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း

- ခွဲစိတ်မှု မပြုမီ ခြောက်နာရီခန့်တွင် ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်၊ အစာမစားပါနှင့် သို့မဟုတ် (ရေကိုပင်) မသောက်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် သင့်အား မေ့ဆေးထုံဆေးပေးသည့်အခါ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
- ဆေးခန်းတွင် အနည်းဆုံး နာရီအနည်းငယ် နေရန်အတွက် စီစဉ်ပါ။
- ယူဆောင်လာရန်-
  - သန့်စင်သုတ်သင်သည့် ဝှမ်းပိတ်ဖတ်များ
  - သင်၏ လွှဲပို့စာ (လိုအပ်လျှင်)
  - သင်၏ မက်ဒီကဲကတ်
  - သင်၏ ကျန်းမာရေးကတ် (သက်ဆိုင်လျှင်) နှင့်
  - ဆေးခန်းက တောင်းဆိုသည့် မည်သည့်အရာမဆိုတို့ဖြစ်သည်။
- သင့်အား အိမ်ပြန်ပို့ပေးရန် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စီစဉ်ထားပါ။

## ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက် မေ့ဆေးထုံဆေး

ဆေးခန်းအပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် မေ့ဆေးထုံဆေးတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ-

- မေ့ဆေး - ကိုယ်ဖျက်ရန်လုပ်ထုံး လုပ်နေစဉ်အတွင်း သင်သည် သတိရှိနေမည် မဟုတ်ပါ
- နိုက်ထရိုက် အောက်ဆိုက် ဓါတ်ငွေ့ - 'နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်စက်မှု' တစ်ခုအတွက် (သင် နီးလာသည့်အခါ စိတ်ငြိမ်ပြီး တည်ငြိမ်နေမည်)
- ထုံဆေး - ထုံဆေးကို သင်၏ သားအိမ်ခေါင်းအတွင်း အနီးအနားထုံသွားစေရန် ထိုးသွင်းပေးသည် သို့မဟုတ်
- စိတ်ငြိမ်ဆေးပါဝင်သည့် ထုံဆေး။

## ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အများစုသော ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် 'စုပုံခြင်း (လေဟာနယ်သုံး၍စုပုံခြင်း) လုပ်နည်း' ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

- သင်၏ သားအိမ်ခေါင်း အဝသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျယ်လာသည်။
- ယင်းနောက် သေးငယ်သည့်ပြွန်တစ်ချောင်းကို သင်၏ သားအိမ်အတွင်း ထိုးသွင်းသည်။
- ကိုယ်ဝန်ကို ညင်သာစွာဖြင့် စုပ်ယူကာ အဆုံးသတ်ပေးသည်။
- ကျူရက် (curette) ဟုခေါ်သော ကိရိယာတစ်ခုကို သားအိမ်မှာ ရှင်းလင်း သွားမသွား စစ်ဆေးရန် အသုံးပြုပါသည်။

**ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်**

ပိုးကူးစက်မှု အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်တွင် (သို့မဟုတ် သွေးဆင်းမှု ရပ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်) -

- ရေဖလားဖြင့် ရေစိမ်မည့်အစား ရေပန်းဖြင့် ရေချိုးပါ။
- လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
- ရေကူးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- တမ်ပွန် (tampon) အစား သန့်စင်သုတ်သင်သည့်ဝှမ်းပိတ်ဖတ်များကို သုံးပါ။

**ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက် မည်သည့်အခါတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကို ရှာမည်**

သင်သည် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ပုံမှန် နောက်ဆက်တွဲ ရက်ချိန်းတစ်ခု ရှိပါမည်။

သင့် ဆေးခန်း သို့မဟုတ် GP သို့မဟုတ် ဆေးရုံ အရေးပေါ်လူနာဌာနကို သွားပါ အကယ်၍-

- သင်၏ သွေးယိုဆင်းမှုမှာ ပိုမိုများလာလျှင်
- သင့်တွင် ကိုယ်ပူအဖျားတက်လာလျှင်
- သင် ပြင်းထန်သော ကြွက်တက်သည့်နာကျင်မှု သို့မဟုတ် ဝမ်းပိုင်း (ဗိုက်) နာကျင်မှုကို ခံစားရလျှင် ဖြစ်သည်။

**ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ**

နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများမှာ ရှားပါးသော်လည်း ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုများ၏ သုံးရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ပထမဆုံးလ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလေ့ရှိသည့် ဤကာလတွင် ဖျက်ချသည့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုများတွင် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၏ ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများမှာ အဖြစ်မများပါ သို့သော်လည်း ၎င်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ-

နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ	လက္ခဏာများ (သို့) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ	လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ
<p>သွေးယိုဆင်းခြင်း- (အလွန်အမင်း သွေးဆင်းခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုမှာ မပြီးပြတ်သေးကြောင်း ရည်ညွှန်းနိုင်သည်)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• တစ်နာရီလျှင် သန့်စင်သုတ်သင်သည့်ဝှမ်းပိတ်ဖတ် အကြီးစား နှစ်ခုထက်ပိုပြီး စိုသွားသည့် နှစ်နာရီကျော်ကျော်ဖြစ်နေသော သွေးယိုဆင်းမှု</li> <li>• သံပရာသီးအငယ်စားအရွယ် သွေးခဲများ ထွက်ကျခြင်း။</li> <li>• အားနည်းသော သို့မဟုတ် မူးဝေသော ခံစားမှု</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုကို ရှာပါ</li> <li>• အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်ကို ဖုန်း 000 ဖြင့်ခေါ်ပါ သို့မဟုတ် သင်နှင့်အနီးဆုံး ဆေးရုံ အရေးပေါ်လူနာဌာနကို သွားပါ (သင်ကိုယ်တိုင် ကားမမောင်းပါနှင့်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မောင်းနှိုင်းပါ)</li> <li>• သားအိမ်ဖွင့် ခြစ်ထုတ်ခြင်း (curettage) အားဖြင့် ကုသပေးနိုင်သည်။</li> <li>• သွေးသွင်းမှု လိုအပ်နိုင်သည် (၎င်းမှာ ရှားပါးပါသည်)</li> </ul>
<p>ပိုးကူးစက်မှု</p>	<p>ဖြစ်နိုင်သည်မှာ-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ကြွက်တက်သည့်နာကျင်မှု (သို့) ဝမ်းပိုင်း (ဗိုက်) နာကျင်မှု</li> <li>• ဝမ်းပိုင်း မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်မှ ယိုစီးထွက်ကျမှု</li> <li>• ကိုယ်ပူအဖျားတက်ခြင်း</li> <li>• များပြားသော သွေးဆင်းမှု</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုကို ရှာပါ</li> <li>• ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးနှင့် ချက်ချင်းကုသရန် သင့် ဆေးခန်း သို့မဟုတ် GP သို့မဟုတ် ဆေးရုံ အရေးပေါ်လူနာဌာနကို သွားပါ</li> </ul>

နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ	လက္ခဏာများ (သို့) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ	လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း</li> <li>• ဝမ်းလျော့ခြင်း</li> <li>• အော့အန်ခြင်း။</li> </ul>	
<p><b>သားအိမ်အား ထိခိုက်မှု</b></p> <p>အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များက ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးသောကြောင့် ၎င်းမှာ ရှားပါးပါသည်။</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှ ဖော်ထုတ်ပေးသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှ ချက်ချင်း သိရှိပြီး ကုသပေးမည်။</li> </ul>
<p><b>သားအိမ်ခေါင်း ထိခိုက်မှု (သို့) အားဆုတ်ယုတ်ခြင်း</b></p> <p>အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များက ခွဲစိတ်နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးသောကြောင့် ၎င်းမှာ ရှားပါးပါသည်။</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ၎င်းသည် အနာဂတ် ကိုယ်ဝန်များတွင် ပြဿနာဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အနာဂတ် ကိုယ်ဝန်များအတွင်း သင်၏ မီးယပ်ဆရာဝန်ကြီးမှ အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မည်။</li> </ul>

**ပိုမိုသော အချက်အလက်များ**

ဤအချက်အလက်စာရွက်သည် ကျန်းမာရေး ဘာသာပြန် အဘိဓာန် (Health Translations Directory) ရှိ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက် သုံးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါတို့ကိုလည်း ကြည့်ရှုပါ-

- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ဆေးဝါးနည်း
- ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း

အမှတ် 1 Treasury Place, Melbourne တွင်တည်ရှိသည့် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အစိုးရမှ ခွင့်ပြုပြီးထုတ်ဝေသည်။  
 © ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဝန်ဆောင်မှုများဌာန၊ ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်  
<http://healthtranslations.vic.gov.au/> တွင်ရရှိနိုင်သည်။